

- ご使用にあたっては以下のことに注意してください。
- 医師・薬剤師の指示に従って使用してください。

ラピフォートワイプの副作用

使用後に、お薬を塗った部位に限らず、以下のような症状があらわれることがあります。このような症状があらわれた場合、また、その他にも気になる症状やいつもと体調が違うと感じるときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

- **口の渇き**

- **接触皮膚炎(かぶれ)**

- **光をまぶしく感じる、目がかすむ**

→本剤の使用を中止し、回復するまで車の運転や危険を伴う機械の操作は行わないでください。

- **尿が出にくい、尿の勢いが弱い、尿が近い**

→本剤の使用を中止し、医療機関を受診してください。

- **体温調節の異常**

・高温・多湿の場所や運動時など、発汗が促進される環境で汗が出ない、体温が異常に上がる

・熱中症を疑う症状がある
(めまい、筋肉の痛み、手足がつる、頭痛、嘔吐、体がだるい、体に力が入らない、集中できない、けいれん、意識の低下等)

→涼しい場所に移動する・体を冷やすなどにより体温を下げ、水分・塩分を補給してください。
速やかに医療機関を受診してください。



ラピフォートワイプ 使用時の注意点

下記にあてはまる場合には、使用する前に医師・薬剤師に伝えてください。

- 以前にお薬を使用して、アレルギー症状が出たことがある方
- 緑内障のある方
- 前立腺肥大症のある方
- 脇に傷や湿疹・皮膚炎等のある方
- 妊娠または妊娠している可能性のある方、授乳中の方